

# PROTOCOL PER A L'AUTORITZACIÓ DE DISPENSACIÓ DE BOMBES D'INFUSIÓ SUBCUTÀNIA CONTÍNUA D'INSULINA

## 1. DADES DEL PACIENT

Cognoms i Nom:

Núm. d'Afiliació a l'ISFAS del titular: 28/7

Entitat Mèdica d'adscripció:

Adreça de contacte:

Telèfon de contacte: Correu electrònic:

## 2. DADES DEL FACULTATIU ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ SOL·LICITANT

Cognoms i Nom:

Núm. de Col·legiat:

Adreça de contacte:

Telèfon de contacte: Correu electrònic:

## 3. DADES DEL CENTRE DISPENSADOR (Dades a complimentar pel Centre)

Nom de l'Hospital o Clínica:

Adreça:

Localitat i província:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

## 4. DADES DE LA BOMBA D'INSULINA (Dades a complimentar pel Centre)

Marca:

Model:

Casa Comercial o distribuïdor:

Import: ,

## 5. INDICACIÓ

### **Requisits que han de complir els pacients als qui es prescriu la bomba portàtil d'infusió subcutània d'insulina**

Amb caràcter general, els pacients susceptibles d'utilització d'aquest tipus de bombes han de tenir la suficient capacitat intel·lectual per llegir i retenir informació i realitzar els ajustos necessaris en la dosi d'insulina.

### ***Assenyaleu a continuació cadascuna de les situacions concurrents en les que es trobi el pacient:***

Pacient diagnosticat de Diabetis mellitus tipus 1. Any diagnòstic:

Pacient diabètic en gestació o en planificació d'embaràs amb mal control malgrat el tractament intensiu.

Ha realitzat un programa educatiu sobre com tenir cura de la diabetis.

Ha mantingut un programa d'injeccions múltiples, com a mínim tres diàries, amb autoajustaments freqüents de la dosi d'insulina.

Data en que es va iniciar el tractament amb injeccions múltiples

Ha realitzat autocontrols de glucèmia, amb una freqüència mitjana de quatre controls diaris durant els dos mesos previs a la indicació de la bomba.

S'ha mantingut en règim d'injeccions múltiples, experimentant durant el mateix les següents circumstàncies:

Hemoglobina glucosilada > 7,0%.

Història d' hipoglucèmia recent

Amplies variacions en la glucèmia preprandial.

Fenòmen de l'alba amb glucèmies que superen els 200 mg/dl.

Història de desviacions glucèmiques severes

, de de

***SIGNATURA DEL FACULTATIU RESPONSABLE DE LA INDICACIÓ***